



## 穗花樹蘭

別名：山棟、鐵羅。

科別：Meliaceae 棟科

學名：*Aphanamixis polystachya*

**重要特徵：**喬木。小枝光滑，嫩芽帶紅褐色。奇數羽狀複葉，對生，革質，卵狀橢圓形，兩面光滑。穗狀花序或圓錐花序。雄花雄蕊筒合生。雌花柱頭膨大呈三角形。蒴果，球形，種子橙紅色；蒴果成熟變黑褐色。

**調查範圍分布：**栽植於龍鑾潭自然中心的停車場附近的稀有植物區內。



## 止宮樹

別名：假茄冬、止楨樹。

科別：Sapindaceae 無患子科

學名：*Allophylus timorensis*

**重要特徵：**灌木。小枝上有皮孔。葉為互生、三出複葉厚紙質，小葉光滑呈橢圓形。花序總狀或圓錐狀，花白色至淡黃色，單性，雌雄同株，花萼花瓣各 4 片。核果為綠色球形，成熟為紅色。

**調查範圍分布：**栽植於龍鑾潭自然中心的停車場附近的稀有植物區內。



## 淡綠葉衛矛

別名：四季青、正木。

科別：Celastraceae 衛矛科

學名：*Euonymus pallidifolia*

**重要特徵：**灌木。小枝細長光滑。葉互生，橢圓形或倒卵形，革質，粗鋸齒緣，呈有光澤的綠色。花多數，黃綠色或淡黃色，雄蕊 4 枚，花絲細長，子房四稜形，花柱短。果實為蒴果，球形，光滑無毛。

**調查範圍分布：**栽植於龍鑾潭自然中心的停車場附近的稀有植物區內。



## 亞洲濱棗

別名：蛇藤

科別：Rhamnaceae 鼠李科

學名： *Ceanothus asiaticus*

重要特徵：蔓性灌木。葉紙質，互生，三出脈呈卵形，先端漸尖，基部圓形或近心形。花淡黃色，聚繖花序腋生，花盤厚，近圓形。蒴果狀核果圓球形，成熟時開裂。

調查範圍分布：栽植於龍鑾潭自然中心的停車場附近的稀有植物區內。



## 蘭嶼肉桂

別名：紅頭嶼肉桂、大葉肉桂。

科別： Lauraceae 樟科

學名： *Cinnamomum kotoense*

重要特徵：喬木。葉近對生，三出脈厚革質，橢圓形或長卵披針形，全緣濃綠油亮具光澤，幼葉成暗紅色。圓錐花序，花小，黃白色。漿果長卵形，枝葉芳香。

調查範圍分布：栽植於龍鑾潭自然中心的停車場附近的稀有植物區內。



## 毛柿

別名： 台灣黑檀、烏木、台灣柿。

科別： Ebenaceae 柿樹科

學名： *Diospyros discolor*

重要特徵：喬木。主幹粗狀直立，樹皮呈黑褐色。全株披黃褐色絹毛。葉互生單葉，葉橢圓披針，葉緣全緣葉端尖，葉基鈍，葉正面平滑。雌雄異株，花冠 4 裂乳黃色。漿果，密被鏽色柔毛。

調查範圍分布：種植於瓊麻歷史工業展示園區步道兩側。



## 三星果藤

別名：星果藤、蔓性金虎尾。

科別：Malpighiaceae

學名：*Tristellateia australasiae*

重要特徵：木質蔓性藤本。莖具皮孔。葉對生，先端銳或銳尖，基部圓或略呈心形。總狀花序，頂生，花柄長，花冠五瓣鮮黃色，雄蕊花絲紅色，花柱細長子房披毛。翅果星芒狀。

調查範圍分布：瓊麻歷史工業展示園區和聚落周邊零星栽植。



## 銀合歡

別名：白相思子、白合歡。

科別：Fabaceae 豆科

學名：*Leucaena leucocephala*

重要特徵：原產南美，灌木或小喬木。二回偶數羽狀複葉，背面是粉白色。花白色圓球狀，小花多數，白色。莢果直而扁平，種子端鈍，基部楔形，褐色。

調查範圍分布：生長於龍鑾潭周邊次生林中，繁殖能力強，為難以防除的雜木，根部劇毒他作用，常形成純林。



## 土蜜樹

別名：土蜜樹、杜蜜樹、夾骨木。

科別：Euphorbiaceae 大戟科

學名：*Bridelia tomentosa*

重要特徵：灌木或小喬木，莖被疏毛。葉互生，長橢圓形，全緣。花白綠色，單性，成總狀簇生於葉腋。核果球形，熟時由綠轉黑色。

調查範圍分布：龍鑾潭周邊灌叢、次生林中層或林緣常見的陽性樹種。



## 欖仁

**別名：**大葉欖仁樹。

**科別：**Combretaceae 使君子科

**學名：***Terminalia catappa*

**重要特徵：**大喬木。老樹根生有顯著之板根，側枝光滑水平輪生，形成平頂傘狀樹冠。葉呈倒卵形，互生，但多叢生於小枝的先端。穗狀花序，花多數淡黃色或黃綠色。核果，卵形或扁橢圓形，成熟由綠色變為黑褐色。

**調查範圍分布：**龍鑾潭周圍多為人工栽植的植株，在墾丁國家公園範圍、道路兩側、聚落周邊皆普遍可見。



## 相思樹

**別名：**臺灣相思、相思仔、香絲樹、假葉豆。

**科別：**Fabaceae 豆科

**學名：***Acacia confusa*

**重要特徵：**大喬木，樹皮灰白色，有縱向細縫裂。假葉互生，披針形或鐮刀狀披針形。花小多數，金黃色，形成球狀的頭狀花序。莢果長橢圓形，扁平，表面平滑，種子扁圓形，黑褐色。

**調查範圍分布：**生長於龍鑾潭周邊次生林中，常形成純林。



## 雀榕

**別名：**鳥榕、鳥屎榕。

**科別：**Moracea 桑科

**學名：***Ficus superba* var. *japonica*

**重要特徵：**大喬木。葉單生互生，叢生於枝條先端，橢圓形，兩面光滑無毛。隱頭花序多數，單生或叢生，呈球形或扁球形。隱頭果球形，紅褐色具白斑。

**調查範圍分布：**龍鑾潭周邊次生林中層或林緣常見的陽性樹種。聚落周邊、龍鑾潭自然中心的停車場附近的誘鳥植物區均有栽植。





## 雞屎藤

別名：雞香藤、臭腥藤、雞糞藤。

科別：Rubiaceae 茜草科

學名：*Paederia scandens*

**重要特徵：**草質藤本。莖纖細，具纏繞性。全株具濃烈臭味。葉互生，葉形變異大，常呈卵形，有時長橢圓形、披針形或劍形等。圓錐花序腋出或頂生，花白紫色。漿果球形，油亮

**調查範圍分布：**龍鑾潭周邊草生地、灌叢、次生林、農耕地和聚落周邊圍籬等環境極為常見。



## 山柚

別名：山柚子、山柚仔、山柑仔。

科別：Opiliaceae 山柚科

學名：*Champereia manillana*

**重要特徵：**小喬木。樹皮灰白色，光滑。單葉，互生，具短柄呈長橢圓形。花序為聚繖花序呈總狀排列。果實為核果，橢圓形平滑，成熟時呈橘紅色。

**調查範圍分布：**生長於龍鑾潭周邊次生林中或林緣環境。



## 過山香

別名：山黃皮、小葉臭黃皮、番仔香草。

科別：Rutaceae 芸香科

學名：*Clausena excavata*

**重要特徵：**灌木或小喬木，樹皮灰褐色。全株常具有濃烈香味。奇數羽狀複葉，小葉互生或近對生，全緣，具油腺點。頂生的圓錐花序，花小形，多數，黃色或淡黃綠色。漿果紡錘狀長橢圓形，成熟時呈淡粉紅色。

**調查範圍分布：**生長於龍鑾潭周邊灌叢，次生林中或林緣環境。

	<h3>多花油柑</h3> <p><b>別名：</b>小果葉下珠、多花葉下珠。</p> <p><b>科別：</b>Euphorbiaceae 大戟科</p> <p><b>學名：</b><i>Phyllanthus multiflorus</i></p> <p><b>重要特徵：</b>小灌木，枝條常呈蔓性。小枝懸垂狀，帶有逆刺。單葉互生全緣，卵形或橢圓狀長橢圓形。雌雄同株異花，總狀花序，腋生，具長花梗，花小。漿果扁圓形，果梗長，熟果由綠轉紅變紫黑。</p> <p><b>調查範圍分布：</b>生長於龍鑾潭周邊灌叢或次生林緣環境。</p>
	<h3>長穗木</h3> <p><b>別名：</b>玉龍鞭、木馬鞭、藍蝶猿尾木。</p> <p><b>科別：</b>Verbenaceae 馬鞭草科</p> <p><b>學名：</b><i>Stachytarpheta jamaicensis</i></p> <p><b>重要特徵：</b>原產熱帶美洲。小灌木。葉對生，卵狀長橢圓形，葉面粗糙，葉緣粗鋸齒。穗狀花序頂生，花軸肥大，花梗細長，花深藍色。蒴果，長橢圓形。</p> <p><b>調查範圍分布：</b>生長於龍鑾潭周邊草生地、灌叢或次生林緣環境。</p>
	<h3>慈菇</h3> <p><b>別名：</b>剪刀草、三腳剪。</p> <p><b>科別：</b>Alismataceae 澤瀉科</p> <p><b>學名：</b><i>Sagittaria trifolia</i></p> <p><b>重要特徵：</b>草本水生植物。莖短，着生鬚根多數。具有走莖和球莖。葉叢生，具有長柄，呈箭形，末端開裂呈剪刀形。總狀花序，由葉叢中伸出，花瓣三片白色，單花聚合果，由多數瘦果組成，扁球形，淡綠色，瘦果具翼及喙。</p> <p><b>調查範圍分布：</b>生長於龍水社區的有機稻作栽培區。</p>